

## My Family Farm 私の農場

4代目の農家

4th generation farmer

大豆、トウモロコシ、小麦

・ Soybeans, corn, アルファルファル wheat, alfalfa

ヘクタールの大豆

• 1,538 hectares soybeans

牛肉用のフィードロット

Feedlot for beef cattle

私、妻のモニカ、二名の従業員

 Myself, my wife Monica and two employees



# My Sustainable Farming Practices 私のサステナブルな生産慣行 カバー作物 保全 バッファーストリップ 精密農業技術

COVER CROPS | CONSERVATION | BUFFER STRIPS | PRECISION AG TECHNOLOGY

#### **COVER CROPS**



#### **CONSERVATION**



#### **PRECISION AG**









## 2024 Crop Report 作物報告

- Minimal winter moisture 最小限の冬の湿気
- Wetter spring 湿った春
- Lowest ever rainfall during growing season
  生育期の降水量が過去最低
- On-time harvest 適時の収穫
- Superior quality 優れた品質
- Crops went to crush plants brought home soybean meal to feed cattle

作物は粉砕工場へ-大豆ミールは牛の飼料として持ち帰る





## 2025 Planting Intentions

### 作付け意向

タイミング-通常、4月中旬から下旬

- Timing typically mid- to late April
  天候
- Weather -

今年の冬は湿気がとても少なかった

- Very little moisture this winter
  - 干ばつマップはサウスダコタの大部分を含む
- Drought map includes a large portion of South Dakota

#### 大豆

Soybeans

通常、トウモロコシの後に植えられる

- Usually planted after corn 前年をやや下回る
- Slightly lower than last year



